

3. Valoración Secundaria

Nos basaremos en la inspección y palpación.

Seguiremos la siguiente exploración:



Exploración de cabeza a pies



3. Valoración Secundaria

Cabeza y cuello ¿Qué tenemos que buscar?

- Hemorragias en el cráneo y cara (Oídos, nariz, hematomas en los ojos, orejas...)
- Puntos dolorosos en cráneo, cara y cuello.

Exploración de cabeza a pies



3. Valoración Secundaria

¿Y la frecuencia respiratoria?

Es el número de veces que respira una persona en 1 minuto.

¿Como lo comprobamos?



¿Qué tenemos que comprobar? La frecuencia, el ritmo...

Taquipnea: Frecuencia respiratoria por encima de los valores.

Bradipnea: Frecuencia respiratoria por debajo de los valores.



Valoración frecuencia cardíaca y respiratoria

En un adulto, lo normal es entre 12 a 20.

¡Apuntar los resultados!



Las alteraciones de la frecuencia respiratoria son: **Disnea, Taquipnea, Bradipnea y Apnea...**

test de relleno capilar

Te permite conocer el estado de la circulación periférica. El tiempo que tarda en “recuperar el color” debe ser inferior a 2 segundos. Si supera ese tiempo, indicará que hay una mala circulación periférica.




Valoración neurológica

3. Valoración Secundaria


Cualquier anomalía supone una afectación cerebral.

2. Valoración Pupilar



Muchas personas presentan anisocorias por intervenciones quirúrgicas.

Evaluación Neurológica: Respuesta Pupilar




D Evaluación Neurológica.


2. Tamaño y reactividad pupilar.

Se valora.


- El tamaño de la pupila.



- La simetría.



- Reactividad a la luz.



Respuesta Pupilar

